

Riesenbärenklau

Heracleum mantegazzianum



Merkmale

Allgemeines

Zweijährige, zum Teil über 3 m hohe, krautige Pflanze

Blüten

- Zahlreiche, weissliche Blüten in einem doldigen Blütenstand

Blätter


- Unterste Blätter inklusive Blattstiel bis zu 3 m lang
- Tief fiederförmig geteilt, mit gezähntem Rand

Früchte / Samen

- 10-14 mm lang
- Oval und flach

Stängel

- Bis zu 10 cm dick, hohl
- Rot gesprenkelt
- Borstig behaart



Problematik

Vermehrung	Fast ausschliesslich über Samen : Bis zu 10'000 Samen pro Pflanze, bleiben mehr als 7 Jahre keimfähig. Die Pflanze kann sich aus unterirdischen Knospen regenerieren, wenn die Pfahlwurzel nicht abgestochen wird.
Ausbreitung	Natur : Verbreitung der Samen mit Wind, über Fliessgewässer. Mensch : Verschleppung durch verschmutzte Werk-/Fahrzeuge, Verschiebung von kontaminiertem Boden.
Schadenpotenzial	Verursacht bei Hautkontakt in Kombination mit UV-Strahlung schwere Hautverbrennungen. Bildet dichte Bestände, behindert dadurch Wachstum einheimischer Pflanzen. Absterben der oberirdischen Pflanzenteile im Winter erhöht Erosionsrisiko.
Standorte	Schattige, feuchte Standorte, Flächen entlang von Verkehrswegen, Waldränder, Waldwege, Flussufer, Säume.

Bekämpfung

- Saft der Pflanze führt unter Einfluss von UV-Strahlung zu Hautverbrennungen. Schutzausrüstung tragen, Hautkontakt zwingend vermeiden und bei bedecktem Himmel arbeiten.
- Pflanzen vor der Blüte möglichst bodennah abschneiden, Pfahlwurzel mindestens 15 cm unter dem Boden abstechen.
- Pflanzenmaterial mit Pfahlwurzel sorgfältig abführen und korrekt entsorgen.
- Fachperson beiziehen.

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
■ Blüte • Samenreife							•	•	•	•	•	
Abstechen												

Entsorgung	Blätter / Sprossachse	Blüten / Früchte / Samen	Wurzeln / Rhizome
Garten- / Feldrandkompostierung	•		
Professionelle Kompostierung / Vergärung	•	•	•
Kehrichtverbrennung	•	•	•