

Verlotscher Beifuss

Artemisia verlotiorum



Merkmale

Allgemeines

Mehrkjährige, 40-150 cm hohe, krautige Pflanze

Blüten

- Kleine, unscheinbare, grünlich-braunrote Blüten in endständigem, rispigen Blütenstand

Früchte / Samen


- Klein, unscheinbar

Stängel

- Leicht rötlich, kaum verzweigt

Blätter

- Tief fiederförmig geteilt
- Oberseits kahl und dunkelgrün, unterseits filzig und grau
- Stark nach Eukalyptus riechend



Problematik

Vermehrung	Vor allem vegetativ : Seitliches Wachstum über Wurzelausläufer, Neuaustrieb aus Wurzelfragmenten. Samen kommen nur selten zur Reife.
Ausbreitung	Mensch : Unsachgemässe Entsorgung von Grünabfällen, Verschleppung durch verschmutzte Werk-/Fahrzeuge, Verschiebung von kontaminiertem Boden.
Schadenpotenzial	Bildet dichte Bestände, behindert dadurch Wachstum einheimischer Pflanzen.
Standorte	Gestörte Standorte, Ruderalflächen, Flächen entlang von Verkehrswegen, Flusssufer, Weinberge.

Bekämpfung

- Pflanzen mindestens 2-mal pro Jahr ausreissen, idealerweise bei feuchten Bodenbedingungen. Wurzeln und Rhizome zwingend mitentfernen.
- Bei grossen Beständen: Pflanzen vom Rand des Bestandes zum Zentrum hin ausreissen. Kernfläche, die vor dem Verblühen nicht gejätet werden kann, mindestens 2-mal mähen, um Versamung zu verhindern.
- Pflanzenmaterial sorgfältig abführen und korrekt entsorgen.

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Blüte												
Ausreissen mit Wurzeln und Rhizome												
Mähen												

Entsorgung

	Blätter / Sprossachse	Blüten / Früchte / Samen	Wurzeln / Rhizome
Garten- / Feldrandkompostierung	●		
Professionelle Kompostierung / Vergärung	●	●	●
Kehrichtverbrennung	●	●	●